

ปีที่ 33 ฉบับที่ 11679 วันอังคารที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2553 ๑๙๖/๑๐

กะบีในแกงส้มแซล็อฟฟ์กร่อน

คงเกียรติภูมิ หวานราก เมขุมานุ ภาควิชาพันธุกรรมประดิษฐ์ คณะทั่วไป
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มส.) เปิดเผยแพร่ วิถีวิจัยทดลอง
หันคนแพทยศาสตร์ มส. ให้ได้แกงส้ม ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคใต้มา
ทดลอง ปรากฏว่าสารเมล็ดข้าวโพดปูนด้านในทำให้รากฟักติดทนนานปูน กลับพบการถูก
กัดของรากฟักต้องสิ่งนี้ จึงมีความเชื่อในไปได้รากฟักติดทนนานปูนในแกงส้ม
เมื่อได้รับความร้อนจากการปรุงอาหาร อาจจะมีส่วนช่วยในการลดการเสื่อม
ภายในของฟันได้ ซึ่งได้นำวัสดุเดิมที่ใช้ในการปรุงอาหารมาทดสอบ จนพบว่า
กะบีที่นำมาใช้ปรุงอาหาร เมื่อได้รับความร้อนด้วย จะเกิดปูริซิยาชของสาร
แคลเซียมที่อยู่ในกระดูก ที่สามารถช่วยลดการเสื่อมของเคลือบฟันที่เกิด^{จากกระบวนการคายสารเอนไซม์ที่มีอยู่ในกระดูก}

นางรุจยา ชื่นธรรมณ์ นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำด้านอาหาร ภาควิชาพันธุกรรม
ประดิษฐ์ คณะทั่วไปแพทยศาสตร์ มส. หนึ่งในคณาจารย์ชั้นนำของมหาวิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การทดลองนี้
ได้ใช้สารเมล็ดข้าวโพดปูนน้ำมันมะกอกเป็นตัวแทนของอาหาร
และรากฟักตับกวาง โดยแบ่งสารเมล็ดข้าวโพดปูน 4 ส่วน ล้างน้ำ แล้วนำเข้าสู่น้ำดอง
อย่างต่อเนื่อง สำหรับ 2 น้ำมันมะกอกใส่กะบีซึ่งหนึ่งของที่ใช้ในแกงส้มปกติ และส่วนที่ 3 น้ำมันมะกอกใส่กะบีปูน กับส่วนที่ 4 น้ำมันมะกอกใส่กะบี สองห้าวของที่ใช้ในแกงตับกอดี และได้นำรากฟักตับกอดีในสารละลาย วันละ
15 นาที ทิ้งไว้เป็นเวลา 29 วัน พบว่ามีการเสื่อมฟันที่ต่ำกว่าเดิม ในสารละลายที่รักษา^{ไว้}
ไว้ 29 วัน ฟันเสื่อกกร่อน 1.22 ในครอง ส่วนที่ 2 ฟันเสื่อกกร่อน 99 ในครอง ส่วนที่ 3
ฟันเสื่อกกร่อน 79 ในครอง และ ส่วนที่ 4 ฟันเสื่อกกร่อนเพียง 46 ในครองเท่านั้น
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปริมาณกะบีที่นำมาใช้ทดลองมีส่วนลดค่าญี่ห์ช่วยลดการ
เสื่อกกร่อนของเคลือบฟันได้

ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูลได้แนะนำผู้รับประทานอาหารแบบปรุงรักษา สำหรับฟัน
กันที่หลังคินของเมรี่ภาระเงินให้เดือนยังเพราการลับผ้าถักกรด จะทำให้
สารเคลือบฟันหลุดออกป่วยยิ่งขึ้นดังนั้นจึงจำกัดการใช้เมรี่ภาระเงินวัน
ปีกตัวยังน้ำเยื่อสำหรับน้ำยาฟลูออร์ แนะนำให้เวลาผ่านไปปีปีน้อย 1
ครั้ง ไม่จึงแนะนำให้หันฟันซึ่งจะช่วยให้ฟันเสื่อกกรอนเร็วเกินไป

กิจกรรมสังคม

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3055 วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2553 ๑๙๖/๑๒

ไม่ดีไปประโยชน์

นายสุวิส่อง


ส่วนใหญ่จะพบคัน “หมี
เหม็น” ได้ตามศูนย์ศึกษาและพัฒนา
งานศาสตร์ชุมชนพัฒนา อย่างที่ทุกที่
11 เพชรป่าสังwan แห่งชาติชุมชนแม่วัง
ต.แม่ปีง อ.ตดอยสะเก็ต
จ.เชียงใหม่ จะมีพืชสมุนไพรนี้
อยู่ด้วย

เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ LAU-
RACEAE ต้นครองสูงได้ถึง 20
เมตร เมล็ดมากต้นสีน้ำตาล
สรรพคุณทางยา ทนถูกก่อนได้ใน
มาตรฐานระดับนานาชาติ มาก
แม่ปีงด้านล่างนี้ เมล็ดอุดตันน้ำปี๊บ
เมล็ดติดพอกดินได้มาก เป็นต้น

ใบ เป็นใบเดียว ลักษณะ
รีียงสั้น ความกว้าง 6-10
センติเมตร ยาว 15-20 センติเมตร
โคนสอน ปลายแหลม มีเส้นแขนงใบ
9-13 ครีบ

‘หมีเหม็น’ ใบสระผมได้

ลอก รีบ้าอมเหลือง ออกเป็น
ช่อ กระฉุกที่ขอกใบ ล้านด้อบาร์ 1-



2 ลอนติดครับ มี 3 กลับ แยกเป็นชุด
ๆ คละตัน มีเกรดงาม

ผล ทรงกลมเล็ก ผลสุกสีม่วง
ล้มหรือตัด ใบได้ รสหวานอมเปรี้ยว
ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ขอ
ตินร่วม ความชื้นและแสงแดด
ปานกลาง