

คม·ชัด·ลึก

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4003 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 หน้า 21

ปัสสาวะเป็นเลือด





รู้จักมะเร็ง
นพ.วิรุฒิ อิมสำราญ

ระวัง มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ


แฟนเพลงยุคฟีฟ่า ชักตักงูรู้สึกเสียใจกับการจากไปของแอนดี้ วิลเลียมส์เมื่อสัปดาห์ก่อน หลังจากที่ต่อสู้กับ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มาแรมปี และเป็นความบังเอิญที่นักร้องชื่อดังอีกคนหนึ่งในยุคเดียวกันคือ แฟรงค์ ซินาตรา ก็เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

เช่นเดียวกันแต่กลับเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อ 14 ปีก่อนจริงๆ แล้วมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นมะเร็งที่พบไม่บ่อยเรียกว่าไม่ติดอยู่ใน 5 อันดับแรกเสียชีวิตช้าและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเป็นพิเศษกับอาชีพนักร้องแต่ประการใด แต่ปัจจัยที่เชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุก็คือ การสูบบุหรี่ สารเคมีที่มีส่วนประกอบของสารอะนิลีนหรือสารพวกไฮโดรคาร์บอน ซึ่งพบได้มากในสีย้อมผ้า ย้อมหนัง ที่เอามาผสมอาหาร สี ย้อมผม และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ยาง สายไฟฟ้า จากการได้รับยาเคมีบำบัดบางชนิด เช่น ยา



ไปอุดตันท่อไตก็อาจมีอาการปวดหลังหรือภาวะไตวายได้

การตรวจพิเศษที่เลี่ยงไม่ได้คือการส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปดูในกระเพาะปัสสาวะและตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจ การตรวจเอกซเรย์ที่เรียกว่า ไอวีพี เพื่อดูการทำงานของไตและดูว่ามีมะเร็งไปอุดตันท่อไตหรือไม่ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้อง



เพื่อดูว่ามีการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองและอวัยวะอื่นๆ ในช่องท้องด้วยหรือไม่ และอาจต้องตรวจโบนสแกนเพื่อดูว่ามีโรคกระจายไปกระดูกหรือเปล่า


ส่วนการรักษาขึ้นอยู่กับระยะของโรค ถ้าเป็นน้อยก็ใช้จี้ไฟฟ้าทำลายก้อนมะเร็ง ในบางรายอาจใส่ยาเคมีบำบัดเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะร่วมด้วย ถ้าเป็นมากขึ้นก็ต้องผ่าตัดโดยอาจจะเก็บกระเพาะปัสสาวะไว้

ให้เหลืออยู่บางส่วน หรืออาจผ่าตัดเอากระเพาะปัสสาวะพร้อมกับอวัยวะข้าง



ไซโคลฟอสฟาไมด์ การติดเชื้อพยาธิใบไม้ชนิดอาศัยในเลือด โดยพยาธิชนิดนี้มักจะวางไข่ที่ผนังของกระเพาะปัสสาวะทำให้เกิดการระคายเคืองเรื้อรัง นอกจากนี้การระคายเคืองและการอักเสบเรื้อรังจากก้อนนิ่วในกระเพาะปัสสาวะก็เป็นสาเหตุชักนำให้เกิดโรคนี้อีกเช่นกัน โดยทั่วไปมะเร็งกระเพาะปัสสาวะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 3 เท่า ในบ้านเรานั้นพบได้บ่อยในผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไปและใน

ผู้หญิง 45 ปีขึ้นไป อาการยอดฮิตหนีไม่พ้นเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดโดยไม่มีอาการเจ็บปวดพบได้ถึง 3 ใน 4 ของ



เสียงฮกทั้งหมด แล้วนำสำลีเสียบางส่วนมาทำเป็นกระเพาะปัสสาวะใหม่แทน บางรายอาจใช้การฉายแสงหรือการให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วยก็ว่ากันไป เพราะฉะนั้นก็หมั่นสังเกตสีของปัสสาวะเวลาปลดทุกข์ให้เป็นนิสัยด้วย ถ้าผิดปกติก็รีบมาพบแพทย์นะครับ...ขอบอก