



ปีที่ 69 ฉบับที่ 21926 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หน้า 7



มันสำปะหลังระวัง...ไรแดง

เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง กรมวิชาการเกษตรเตือนชาวไร่มันสำปะหลัง...
อย่าทักทักเข้าใจผิด เดี่ยวจะสูญเงินเปล่าๆ

เห็นต้นใบมันสำปะหลังเหลืองแห้งเหี่ยวคิดไปเองว่าเจอเพลี้ยแป้ง
เพลี้ยไฟเล่นงาน ไปซื้อยามาฉีดมาฉีดพ่น อากาศไม่ดีขึ้น...ก่อนจะไป
หาซื้อสารมากำจัด เดินเข้าไปดูใกล้ๆให้ชัด จะเห็นสัตว์ตัวเล็กจิ๋วเท่า
ปลายเข็มสีแดงเป็นกลุ่มเต็มไปหมด ดูด้วยตาแบบนี้จะยากหน่อย
เพราะตัวมันเล็กจริงๆ แต่ถ้าสังเกตแบบง่ายๆ ตรงก้านใบมันสำปะหลัง
จะมีหยากไย่คล้ายแมงมุมชักใย ในหยากไย่จะมีอะไรสีแดงๆ
เต็มไปหมด



นี่แหละ ไรแดง
เหมือน ศัตรูตัวฉกาจ
ของมันสำปะหลังในทุก
ระยะการเติบโตโดยเฉพาะ
ในฤดูแล้ง มาดูकिनน้ำ
เลี้ยงใต้ใบแก่และใบ
เปสลาดเกิดเป็นจุดประ-

ด่างเหลืองบนผิวด้านบนใบ

หากระบาดรุนแรงจะเคลื่อนย้ายไปดูकिनน้ำเลี้ยงบนยอดอ่อน
สร้างเส้นใยปกคลุมใบและลำต้น ทำให้ใบไหม้ตรงกลางใบขาดพรุน
ใบร่วง และเหี่ยวแห้ง

ถ้าพบระบาดของไรแดงเหมือน ให้เก็บใบมันสำปะหลังและ
ส่วนที่เป็นโรคนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก

พื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง ให้เกษตรกรฉีดพ่นด้วยสารกำจัด
ไรเป็นการเฉพาะ...อย่าได้ไปซื้อสารกำจัดแมลง หรือเพลี้ยมาใช้
เด็ดขาด จะเปลืองทั้งค่ายาและค่าจ้าง เพราะฉีดไปไม่ได้ผล

สารกำจัดไรมีให้เลือกใช้ได้ตั้งแต่ ไพรดาเบน 20% คับเบิ้ล
ยูพี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เฟนบูทาตินออกไซค์ 55%
เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สไปโรมิซเฟน 24%
เอสซี อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เตตระไดฟอน 7.25%
อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

แต่มีข้อห้าม ไม่ควรพ่นสารชนิดเดียวกันติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง
ควรพ่นสลับชนิดสารเพื่อป้องกันไรแดงตื้อยา.

ส-ล-๓