


# เตลีพิวส์

ฉบับที่ 25,290 วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 หน้า 8

## วิธีการห่อผลชมพู่ไต้หวันให้ผลใหญ่และป้องกันแมลง

ต้นชมพู่ไต้หวันหลังปลูกเพียง 6-8 เดือนเริ่มออกดอกติดผลให้ผลผลิตแล้ว หลังจากปลูกและดูแล บำรุง ต้นชมพู่ไต้หวันมาดี ต้นชมพู่ก็จะพร้อมให้ผลผลิตได้เก็บเกี่ยวได้บ้าง 3-5 กก. แต่จะเริ่มให้ผลผลิตเต็มที่ในปีที่ 2 เป็นต้นไป เพราะด้วยขนาดต้น และทรงพุ่มที่โตมากพอควรแล้ว โดยต่อการออกดอก 1 รุ่นสามารถห่อผลได้ครั้งละ 40-80 ถุง (ขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่ม) หรือเป็นน้ำหนักก็ประมาณ 30-50 กก.ต่อต้น ซึ่ง 1 ถุงห่อจะเลือกไว้ผล 3-5 ผลจะเหมาะสมที่สุด จะได้ชมพู่ที่มีคุณภาพ ทรงผลสวย และผลใหญ่ ซึ่งการห่อผลชมพู่เป็นการปลิดผลที่มากเกินไปจึงมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นการกำหนดขนาดและน้ำหนักของผลชมพู่ว่าจะมีผลเล็กหรือใหญ่เพียงใด โดยหลักการง่าย ๆ ینگไว้ผลมากผลยังเล็ก อย่างการไว้ผล 5 ผลต่อช่อขึ้นไปย่อมทำให้ชมพู่มีขนาดผลเล็ก ว่างผลน้อยก็ยิ่งจะได้ชมพู่ผลใหญ่ ดังนั้นต้องเลือกไว้ผลอย่างเหมาะสม ซึ่งการออกดอกชมพู่จะออกบริเวณกิ่งในทรงพุ่มและส่วนยอด (แล้วแต่สายพันธุ์) หลังจากดอกได้รับการผสมแล้ว ก็จะติดเป็นผลที่มีขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายถั่ว หลังจากนั้นผลจะขยายใหญ่ มีสีเขียวเข้มขึ้นเป็นทรงผลชมพู่ขนาดเล็ก เกษตรกรควรทำการปลิดผลที่ถูกโรคแมลงทำลาย โดยเฉพาะผลชมพู่ที่แมลงวันทองเจาะทำลายและเพลี้ยไฟทำลายผิว คนห่อต้องเลือกปลิดทิ้งไปผลที่มีขนาดเล็กหรือรูปร่างผิดปกติออก โดยเหลือไว้ช่อละ 3-5 ผลเท่านั้น กรณีที่มีช่อผลหลาย ๆ ช่ออยู่มากในกิ่งเดียวกันไม่ควรเก็บไว้




ให้เลือกปลิดช่อที่มากเกินไปออก อย่งการออกดอกของชมพู่ไต้หวันทั้งชมพู่ยักษ์ไต้หวันและชมพู่สตรีเบอร์รี่ นิสัยจะออกดอกเป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งอาหารกันเองทำให้ผลมีขนาดเล็ก และจำนวนการห่อไม่ควรมากเกินไป โดยให้สัมพันธ์กับทรงพุ่มและความสมบูรณ์ของต้น

การห่อผลทำให้ผิวสวย ป้องกันการทำลายจากแมลงวันทอง ก่อนห่อผลแนะนำให้ฉีดพ่นฮอร์โมนช่วยบำรุงดอก เช่น โบร่า หรือแคลเซียมโบรอนอี เพื่อช่วยผสมเกสรง่ายและติดผลดี ฉีดพ่นสัก 2-3 ครั้ง คือ ช่วงเริ่มออกดอก ดอกเริ่มบาน และหลังเกสรดอกเริ่มโรย การห่อผลชมพู จะทำควบคู่กับการปลิดเลยในเวลาเดียวกัน ในการห่อผลนี้เกษตรกรจะเลือกถุงพลาสติกแบบมีหูหิ้วสี

ขาวขุ่นเจาะ 3-5 รู หรือใช้มีดกรีดกันถุงเพื่อให้เป็นรูระบายน้ำออกและระบายอากาศ ก่อนห่อจะใช้วิธีฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง คือ เมกก้า (ไซเพอร์เมทริน) อัตรา 10 ซีซี เพื่อฆ่าแมลงศัตรูที่อาจจะเกาะที่ผล เช่น เพลี้ยไฟ+ฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน อัตรา 10 ซีซี เพื่อให้ทรงผลชมพูยาวและขยายขนาดผล+เทรนเนอร์ 10 ซีซี เพื่อช่วยบำรุงผล ผสมทั้งหมดในน้ำ 5 ลิตร โดยจะแบ่งใส่ในกระบอกฉีดน้ำหรือฟ็อกกี้ เมื่อปลิดผลเสร็จจะฉีดด้วยสารและฮอร์โมนดังกล่าว แล้วจึงห่อด้วยถุงพลาสติกมีหูหิ้ว ขนาด 6x14 หรือ 7x15 นิ้ว



โดยจะผูกปากถุงด้วยเงื่อนชั้นเดียวแล้วอาจจะผูกโยงหูถุงกับกิ่งหลักในทรงพุ่มด้วยเชือกฟาง เพื่อไม่ให้กิ่งฉีกหักเมื่อผลชมพูโตน้ำหนักก็จะมากขึ้น หลังจากห่อผลได้ราว 1 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวชมพูขายได้ ซึ่งรวมเวลาดังแต่แทงช่อดอกจนเก็บเกี่ยวได้จะใช้เวลาราว ๆ 3 เดือน



การผลิตชมพูยักษ์ได้วันให้มีคุณภาพดีและรสชาติหวานกรอบ ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต 15 วัน ควรจะใส่ปุ๋ยทางดินที่เพิ่มความหวานมีสูตรตัวท้ายสูง ๆ เช่น 13-13-21, 14-14-21 อัตราต้นละ 500 กรัมต่อต้น (ต้นชมพูอายุ 2-3 ปี) แต่ถ้าต้นชมพูยักษ์ได้วันมีอายุต้น 5 ปีขึ้นไปให้ใส่ต้นละ 1 กิโลกรัม ด้วยชมพูจัดเป็นไม้ผลที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น คือ หลังจากดอกโรยและถอดหมวกมีขนาดผลเท่าหัวนิ้วโป้งจะใช้เวลาเลี้ยงผลเพียง 25-30 วัน.

ทวิศักดิ์ ชัยเรืองยศ รายงาน