

เดลินิวส์

ฉบับที่ 17,013 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ราคา 7 บาท DAILY NEWS

เอโกรอิน

มหาวิทยาลัยมหิดล

(ศ.ดร.พวยวร์ เกมนีองนวงศ์ ผู้ตัด น.น.มหิดล)

เอโกรีน เป็นยาสเปคิดให้ไทยร้ายแรงประเภท 1 เตรียมโดย用人อร์ฟีนมาทำปฏิกิริยาทางเคมีกับกรดน้ำส้มขาดน้ำ (ANHYDROUS ACETIC ACID) ถูกของเอโกรีนรุนแรงกว่ามอร์ฟีนประมาณ 4-8 เท่า และแรงกว่าฟิน 30-80 เท่า ติดจ้ำยมาก แต่เลิกสูบยา กว่ามอร์ฟีนและฟิน ถูกของเอโกรีนจะกดประสาท ทำให้อ้วง จุนง หลับได้สนิทและยาวนาน อาจมีกลืนไส้ อาเจียน เปื้ออาหาร ร่างกายทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว ผ่อน ชีดเหลือง ขอนตากล้า ดวงตาเหมือนดอย สามงและประสาทเสื่อม ความจำเสื่อม อ่อนเพลียไม่มีแรง ผู้ที่สเปคิดต้องการเสพมากและบ่อยขึ้น มักจะก่ออาชญากรรม พากนี้มักอายุต้น สาเหตุการตายมักมีโรคแทรก หรือใช้ยาเกินขนาด.

ถ้าผู้สเปคิดขาดยาหรือไม่ได้เสพเมื่อถึงเวลา จะเกิดอาการทุรนทุรายทรมานมากที่สุด น้ำมูกน้ำตาไหล ความคิดฟังช้าน สับสน ปวดเจ็บตามกล้ามเนื้อและกระดูก ปวดห้องอย่างรุนแรง หูอื้อ ตาพร่า อาเจียนอย่างรุนแรง ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด นอนไม่หลับ อาจมีอาการเพ้อคลั่ง ชักหมดสติ อาจตายได้ ซึ่งถ้าให้ยาตอนอย่างมาก ๆ อาจใช้ยาเกินขนาด หัวใจอาจหยุดทำงาน คือเกิดอาการ “ช็อก” ก็ถึงแก่ความตายได้ทันที.

เอโกรีนที่ใช้กันในปัจจุบันมี 2 ชนิด

- “เอโกรีนบริสุทธิ์” หรือ “เอโกรีนเบอร์ 4” หรือ “พงขาว” มีเนื้อเอโกรีน 90-95% เตรียมได้ยากมาก มีลักษณะเป็นพงขาว ไม่มีกลิ่น รสเผ็ด นิยมเสพโดยวิธีฉีดเข้ากล้าม หรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือใช้สูบ เอโกรีนชนิดนี้ราคาแพงมาก

- “เอโกรีนผสม” หรือเอโกรีนเบอร์ 3 หรือเรียก “บีทีปี” หรือ “ไออะເບ່ຍ” ลักษณะเป็นเกล็ด ไม่มีกลิ่น มีสีต่าง ๆ กัน โดยการผสมสารอื่นที่มีส่วนประกอบของสารหมู่เข้าไปประจำได้สีต่างกัน เช่นพูเข้ม สีเดนอุรุรัง หรือสีชนพูอ่อนเทา น้ำดื่มน้ำมีเนื้อเอโกรีน 6-20% เป็นยาเอโกรีนที่ไม่บริสุทธิ์ มีสารพิษ เช่น สารหมู ศดวิกนิน กรดน้ำประสาท กอง ฯลฯ เป็นส่วนผสม นิยมเสพโดยวิธี “สูดไออะເບ່ຍ” ใช้สีในข้อนใบอะหรือกระดานตะกั่วลงไฟให้เป็นควัน แล้วใช้หลอดดูดไอฟู่ดูดเอาควันเข้าในปอด หรือใช้ผงขัดที่สีในบุหรี่สูบ หรือนำมาตีดาบน้ำแล้วฉีดเข้ากล้าม หรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำ.