

ສາດ ການຄົມຄ່າ

ນອກໂລບເລື່ອນ

ກຽມກາຣດີກຳປານອກໂຮງເຮັຍນ

ກະທຽວງຕຶກປາຣິກາຣ

ฉบับທີ 291 ປະຈຳປັກຊ໌ຫລັງ

ເດືອນ ມິນາຄມ 2523

ປຸລູກມັນຫະພັນຮຸໂອກຸດ

ແລະພັນຮຸ ມັນແດງຕ້ອນຮັບ

ຄອບພາ

มันเทศเป็นพันธุ์ไม้ถูกใช้หัวเป็นอาหาร
เป็นพืชที่รู้จักดีของคนทั่วไป มันเทศสามารถ
ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย เป็นอาหาร
จำพวกแป้ง ให้ประโยชน์ในการสร้างพลังงาน
แก่ร่างกาย มีด้วยกันหลายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่นิยม
ปลูกกันมากได้แก่ พันธุ์โอกุดหรือชาวบ้านเรียก
ว่า มันเทศหัวโตและพันธุ์มันแดง เพราะตลาด
ต้องการมากและมีราคาดี ซื้อขายกันกิโลกรัม

ละ 4 - 5 บาท

มันโอกุดหรือมันเทศหัวโต มีลักษณะ
หัวโตคลื่อนข้างกลม ผิวเปลือกเรียบสีน้ำตาล
อมส้ม เนื้อในสีเหลือง เถาเป็นสีเขียว ใบมี
ลักษณะคล้ายใบโพธิ์ ไม่มีหยัก ใบอ่อนตรง
ส่วนยอดมีสีเขียวเข้ม เช่นเดียวกับใบแก่ ตั้ง[†]
แต่ปลูกจนถึงเก็บหัวใช้เวลาประมาณ 4 เดือน
และให้ผลผลิตประมาณ 3,500 กิโลกรัมต่อไร่

มันแดง หัวมันมีลักษณะผิวเรียบเปลือก
แดงเนื้อในสีขาวนวล เถาเมื่อค่อนข้างแดง ใบ
เป็นแฉกสามแยก ใบใหญ่และสีเขียวเข้ม ก้าน
ใบและเส้นใบมีสีม่วงเข้ม อายุตั้งแต่ปลูกจน
ถึงเก็บหัวได้ใช้เวลาประมาณ 3 เดือนเศษ
ให้ผลผลิตประมาณ 3,000 กิโลกรัมต่อไร่

มันเทศมักปลูกกันในต้นฤดูฝน แต่ก็มี
ผลเสียได้เมื่อ昆กันถ้าฝนชุกเกินไป คือ ทำ
ให้หัวมันเน่าเสียได้

การปั๊กมันพังหักหักห้ามใช้โดยอุบัติและมันแคงอาจปลูกได้ในร่องสวน ในไร่ หรือในแปลงนาที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีก็ได้

การเตรียมดินปลูก ชุดดินหรือไถคราดดินตากแดดไว้สัก 5 วัน เก็บวัชพืชออกให้หมดแล้วไถคราดให้ร่วนซุยอีก 1-2 ครั้งหนานุ่ยคอกมาใส่ให้ทั่ว ยกเป็นร่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามความยาวของพื้นที่ให้สูงประมาณ 1 ศอกกว้างครึ่งเมตร ถ้าปลูกบนที่ราบในไร่น้ำไม่ขังก็ไม่ต้องยกร่องเพียงแต่ทำร่องเป็นแนวให้ปลูกขนานกันกว้างครึ่งเมตร เพื่อสะเดากในเวลากำจัดศัตรูพืช รถน้ำและขุ่นหัวมันจะได้สะเดากันขึ้น

การปลูกมันเทศใช้ลำต้นหรือเตาปลูกจะลงหัวได้เร็วกว่าใช้หัวมันเทศปลูก

ใช้เตาปลูก ให้ตัดเตาโดยตรงหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือตัดเอาจากເගົາມັນພັນຮຸ້ທີ່ປູກເອາໄວ້ຄວາເລືອກເອາເຄາທີ່ສມບູຽນແລະໄມ່ແກ່ຈົນເກີນໄປ ใช้มີດຄມຕັດถັດຈາກສ່ວນຍອດເຂົ້າໄປປະມານຄືບກວ່າ ၇ ພຍາຍາມຮັກໜາສ່ວນຍອດໄວ້ອຍ່າໃຫ້ขาด ແລ້ວນໍາໄປປັກລົງໃນແປລົງທີ່ເຕີຣີມໄວ້

หรือใช้เคนันที่แกะซึ่งได้จากการเก็บเกี่ยว
โดยตัดจากส่วนยอดเข้าไปท่อนละหนึ่งคีบกว่าๆ
ริดใบให้เหลืออยู่เพียง 2-3 ใบนำไปชำใน
แปลงที่ใช้เพาะชำเสียก่อน จนอกรากแล้ว
แตกยอดดีแล้วจึงตัดยอดไปปลูก

การปลูกให้ปักເຄາຫຼາຮ້ອຍອດມັນລົງໄປ
ໃນພື້ນດິນລຶກພອມວຽກປະມານ 3-4 ນິວຝຸຕ ໃຫ້
ຫົວທ້າຍເຄາໂພລ່ເໜີ້ອດິນ ຮະຍະຮະໜ່ວ່າງຕັນຫຼືອ
ຫລຸມແລະຮະໜ່ວ່າງແຄວໜ່າງກັນປະມານ 1 ຄອກ
ຮະຍະແຮກປຸລູກຄວຽດນໍາທຸກວັນໃນຕອນ
ເຢັນປະມານ 15-20 ວັນເຄາມັນກີຈະລົງຮາກແຕກ
ໄປແຊີ້ງແຮງແລ້ວກີໄມ໌ຕ້ອງຮັດນໍາອີກ

ມັນເທັດຫລັງຈາກປຸລູກແລ້ວປະມານເດືອນ
ເສດຖິ່ງສອງເດືອນ ຕ້ອງມັນຕລົບເຄາໃຫ້ເຂົ້າໄປ
ອູ້ໃນຮ່ອງປຸລູກເສມວ ທັງນີ້ເພື່ອປົ້ອກກັນໄມ໌ໄໝ
ເຄາມັນໄປແທງຮາກນອກຮ່ອງ ຮາກຈະກລາຍເປັນ
ຫົວມັນເລັກ ຖ້າໃຫ້ຫົວມັນທີ່ໂຄນຕັນມີຂາດໄມ໌
ໂຕ ຖ້າເຄາມັນມີມາກົກົດອອກເສີຍບ້າງເພື່ອໄມ໌
ໄໝກິນອາຫາຣາມາກ ມັນຈະລົງຫົວໂຕສມບູຮັນເຂື້ນ
ແລະໄດ້ຜລຜລິຕາມາກ

ກາຣໃສ່ປຸ່ຍຈະໃສ່ປຸ່ຍຄອກຫຼືອປຸ່ຍເຄມືກີໄດ້
ຫລັງຈາກປຸລູກໄປແລ້ວປະມານ 2 ເດືອນເສດ

ใช้เสียงพรวนดินรอบ ๆ เสียงก่อน จึงเอาปุ่ย
ใส่ลงไป ปุ่ยเคมีที่ใส่มันเทศใช้สูตร 13-13-

21

ปลูกมันเทศปลายฤดูฝนก็หมดปั๊วหาน
เรื่องหัวมันเน่า แต่ก็ยังมีศัตรูที่มาบกวนมัน
เทศที่ควรกำจัดได้แก่แมลงเต่าลายกัดกินใบ
ทำให้ต้นโตช้า หัวมันไม่โต ควรใช้ยาแลนเนท
อาโซดริน เชฟวิน 85% และออลดิรินพ่นฉีด
ใบเมื่อมีอายุได้ 2 เดือนครึ่ง หรือเมื่อมีแมลง
นี้ระบาดกินใบ

มักจะพบหัวมันเทศเป็นรูแคระแกร็น
มีกลิ่นเรียกว่า “แมงกิน” มีกลิ่นไม่ชวนกิน
และมีร่องรอยขึ้นทั้งนี้เกิดจากตัวหนอนของแมลง
ปีกแข็งใช้เข้าไปกัดกินหัวมัน จนภายในหัว
มันเป็นแมง เราควรกำจัดมันโดยใช้ยาออล
ดิรินลดหรือพ่นโคนต้นประมาณ 3 ครั้ง ครั้ง
แรกเมื่อมันอายุได้ 1 เดือน ครั้งที่สองเมื่อมัน
อายุได้ 2 เดือนครึ่งและครั้งที่สามเมื่อมันอา
ยุได้ 3 เดือนครึ่ง

ในการใช้ยาดังกล่าวต้องใช้ในอัตรายา 1 ส่วนต่อหน้า 400 ส่วนหรือยา 1 ช้อนแกงต่อหน้าหนึ่งปืน เมื่อพ่นน้ำยาได้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในสلاกอย่างเคร่งครัด

การขุดเก็บหัวมันเทศทั้ง 2 ชนิดนี้ให้ขุดได้มีเมื่อมีอายุได้ 4 เดือนและ 3 เดือนเศษตามพันธุ์ของมันอย่าปล่อยไว้ให้มันแก่เกินไป มันจะเป็นเสี้ยนเนื้อไม่เหนียว

ใช้สองง่ามขุดตามโคนหลุมต้นมันรัดหัวมันขึ้นให้หมดทั้งเปลงก่อนแล้วจึงเก็บหัวมันบรรจุเข่งทีหลัง ถ้าทีเดินเห็นวิดินจะติดหัวมันให้ล้างให้สะอาดก่อนนำไปเก็บควรเก็บไว้ในที่ป้องไม่อับ

(เรียบเรียงจากเอกสารของกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
