

ข่าวสารเภสัชพาณิชย์

เมษายน 2528

หน้า 6

เต้าเจี้ยว

(จากเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการ การคุ้มครองผู้บริโภค)

อเมริกันได้ค้นพบว่า โรค "เฮดส์" หรือ โรคที่ขาดภูมิคุ้มกันนั้น เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง และนอกจากจะติดต่อกันได้ทางการร่วมเพศแล้วยังติดต่อทางกรรมพันธุ์ได้ทั้งจากทางบิดาและมารดา ปัจจุบันมีปัญหาทางสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ต้องการให้ลูกหลานของตนแก่ผู้อื่น ผู้ที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม เมื่อทราบว่าเป็นโรคนี้ก็จะรังเกียจไม่รับเป็นบุตรบุญธรรม เพราะต้องเสียค่ารักษาตัวสิ้นเปลืองมาก การติดต่อยังติดต่อได้โดยการรับโลหิตจากผู้ที่มีเชื้อ "เฮดส์" การร่วมเพศเดียวกัน โดยเฉพาะร่วมเพศทางทวารหนัก มีโอกาสติดเชื่อได้ง่าย

หนังสือ "ข่าวแพทย์ของนิวอิงแลนด์" ได้ตีพิมพ์เรื่องเกี่ยวกับโรค "เฮดส์" ว่า นายแพทย์แมดส์ เมลโบย์ แห่งโรงพยาบาลแอริส ประเทศเดนมาร์ค ได้ทำการค้นคว้าพบว่าหญิงและชายที่ร่วมเพศกันทางทวารหนักจะติดเชื่อไวรัส "เฮดส์" ได้ง่าย โดยได้ตรวจโลหิตผู้ที่ร่วมเพศทางทวารหนัก 14 คน พบว่า เพื่อนหญิงของผู้ป่วยโรค "เฮดส์" คนหนึ่งมีเชื้อไวรัส "เฮดส์" ในทวารหนัก

และน้ำ 9 ถ้วยตวง

วิธีทำ ให้นำส่วนผสมมาคั่วเอาสิ่งสกปรกออกให้หมด จากนั้นนำไปล้างน้ำให้สะอาด แช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน ให้นำท่วมถ้วยเหลือง และนำถ้วยเหลืองที่แช่ค้างคืนไว้นั้นมากลึงเอาเปลือกออกให้หมด แล้วนำไปนึ่งไฟแรงประมาณ 15 นาทียกลง นำถ้วยที่นึ่งแล้วมาเกลี่ยบนตะแกรงพอถ้วยอุ่น ๆ ก็นำเชื้อเต้าเจี้ยวลงเคล้าให้ทั่ว เกลี่ยเสมอกันแล้วปิดด้วยกระดาษหนึ่งสี่อพิมพ์นำไปไว้ในที่อับ โดยให้อากาศผ่านเล็กน้อย ทิ้งไว้ 2 วัน เปิดดู จะมีราสีเขียวเหลืองขึ้นอยู่เต็ม ให้กลับเอาถ้วยข้างล่างขึ้น ปิดไว้อย่างเดิม ถ้ามีราสีเขียวเหลืองขึ้นอยู่เต็ม ก็เปิดกระดาษออก แล้วใช้ผ้าบาง ๆ ปิดวางไว้ในที่อากาศผ่านได้ ทิ้งไว้จนถ้วยแตก ระวังแล้วจึงนำถ้วยมาแยกให้กระจายกันเป็นเม็ด ๆ ใส่ลงในขวดแก้วที่จะใช้เก็บเต้าเจี้ยว โดยล้างขวดให้สะอาด และลวกน้ำร้อน ใส่ถ้วยลงไปประมาณ 2 ใน 3 ของขวด แล้วตม้น้ำเกลือ น้ำตาลจนเดือด ยกลงกรองด้วยผ้าขาวบาง ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น แล้วเทใส่ขวดที่ใส่ถ้วยเตรียมไว้ นำไปตากแดดประมาณ 20 วันแล้วนำเข้าร่ม ตั้งทิ้งไว้อีก 15 วันจึงนำมารับประทานได้

★★★★★★