

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ปีที่ 15 ฉบับที่ 5088

อาการเสพติด

สุขภาพ

ยาเสพติด ได้รับการกล่าวขานมานานว่าเป็นยาแห่งความรัก แม้สถานะของมนุษย์เป็นยาเสพติดชนิดร้ายที่มีพื้นฐานมาจากยาบ้า แต่ความเชื่อที่ว่าเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ทำให้ค่าของมนุษย์เพิ่มขึ้นไม่จำกัดเฉพาะแค่วัยรุ่นชั้นสูงเท่านั้น หากกำลังเข้ามาในบทบาทในชีวิตประจำวันของครอบครัวคน

หญิงคนหนึ่งเล่าว่า สามีชอบใช้สารเดมีประเทยาปลุกเซ็กซ์หยดในเครื่องดื่มใช้กระตุ้นและเพิ่มความต้องการทางเพศของทั้งคู่โดยอมรับว่ากินแล้วมีความต้องการมากแต่ด้วยสัญญาไม่ได้ว่าเป็นสารประเภทอะไร และมีอันตรายหรือไม่ เธอรู้เพียงว่าสามีมักเรียกว่า ยาเสพติด

หญิงสาวรู้สึกหื่นใจ เพราะไม่ทราบว่าสารตัวนั้นจะส่งผลต่อร่างกายในระยะยาวหรือไม่ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อไม่กล้าขัดใจสามีทั้งที่ลึกอยากให้สามีเลิก

ตัวอย่างของหญิงสาวรายนี้เป็นกรณีที่มีต้นเหตุจากปัญหาความบกพร่องพื้นฐานเรื่องเซ็กซ์ทำให้สามีต้องหันไปพึงพาสารเคมีบางจำพวกซึ่งมีฤทธิ์ต่ออารมณ์ทางเพศโดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับสารดังกล่าว

ในงานเขียนหัวข้อ 'จากยาบ้าสู่ยาเสพติด' ของนักวิชาการด้านจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๓ คน ประกอบด้วย ทรงเกียรติ ปิยะกะ, ชาญวิทย์ เงินศรีตระกูล และ อานันท์ วิทยานันท์ ให้ข้อมูลว่า ยาเสพติด เป็นสารเคมีตัวหนึ่งซึ่งนิยมใช้กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ โดยเฉพาะในหมู่คนเมืองในสังคมปัจจุบันตามชื่อของยาที่บ่งบอกถึงคำว่ารักตรงๆ

ต้นกำเนิดจากยาบ้า

เมื่อปี ค.ศ. 1914 บริษัท Merck ซึ่งเป็นบริษัทเภสัชกรรมขนาดใหญ่พยาบาลสังเคราะห์อนุพันธ์ชนิดใหม่ๆ ของยา amphetamine เพื่อสร้างยาลดความอ้วนที่มีคุณภาพดีขึ้นแต่กลับได้ยา MDMA แทน บริษัทจึงได้ลงทะเบียนส่วนลิขสิทธิ์ไว้ ควบคุมสิ่งสมัยหลังสัมภาระโลกครั้งที่ ๒ กองทัพบกสหรัฐอเมริกาจึงมีการวิจัยยาอีอย่างจริงจัง พบว่า ยาอีไม่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทร้ายแรงพอที่จะใช้เป็นวัตถุสุสกรรมได้แต่อย่างใด

ต่อมาในช่วงสงครามเวียดนามซึ่งเป็นยุคบุปผาชนสัมภาระบันบวนมากจึงเริ่มมีการใช้ยาอีในหมู่ผู้เสพยาเสพติด ก็พบว่า ยาอีมีคุณลักษณะแบบ ทำให้ผู้เสพเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจอย่างประหลาด ต้องการแต่จะเปิดเผยความในใจ มีส่วน

ร่วมรู้ในความรู้สึกนี้คิดกับบุคคลอื่นๆ "ประหนึ่งถักสายป่าน" ไปทางด้านจิตใจซึ่งกันและกัน"

นอกจากนี้ยังพบว่า ยาอีมีคุณลักษณะเป็นยาที่ทำให้จิตประสาทบิดเบี้ยว คือ ทำให้การรับรู้ทางอายุตันสัมผัสผิดแยกแตกต่างไปหมด เช่น มีความรู้สึกว่ากุหลาบมีรสหวานน้ำตาลมีเสียงไฟแรงเสียงเพลงมีความอบอุ่น ความละมุนของดนตรีมีความหนาจิตใจวัดได้ด้วยระยะเวลา เป็นต้น

ยาอีได้ระบาดจากอนามัยไปยังประเทศต่างๆ รวมถึงไทย แต่ เพราะราคาแสนแพง ทำให้การใช้ยา มีอยู่ในวงแคบ มีเพียงกลุ่มเยาวชนที่มีกำลังซื้อสูง และในหมู่ดาราที่มีชื่อเสียง ทำให้เยาวชนวัยรุ่นหัวไปเลียนแบบกลายเป็นกระแสนิยม เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยาอีระบาดหนักในหมู่วัยรุ่นและหลังจากนั้น ยาอีก็ได้พัฒนามาเป็นยาเสพติดที่มีส่วนผสมเพิ่มเติม มาอีก ๓-๔ ชนิด แต่ยังมีพื้นฐานของยาบ้าเป็นตัวบังคับ และเน้นผลในการเริงรமย์มากขึ้น

ผลกระทบคลินิก

ยาอีและยาเสพติดมีผลกระทบคลินิกต่อร่างกาย คล้ายคลึงกับยาบ้า (amphetamine) มาก กล่าวคือ ระยะแรกจะเป็นผลที่เกิดจากการกระตุ้นของยา เพราะมีสื่อเคมี dopamine และ serotonin หลังออกมากามา ต่อไปจะเป็นผลจากการที่สารสื่อเคมี เทือดแห้งไป การที่มีสารสื่อเคมี dopamine มากขึ้นจะทำให้เกิดผลตามมา คือ มีการสร้างความตื่นตัวสูงสุดขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการติดยา ส่วนการที่สื่อเคมี serotonin ลดน้อยลง จะส่งผลให้เกิดอาการขาดยาทางใจ คือ มีอาการเบื่อหน่าย ซึ่งเครียดคล้ายกับป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั่นเอง

การเริ่มแรกจะเกิดขึ้นประมาณ 20-40 นาที หลังการเสพยาอีโดยการกินเข้าไปแล้ว โดยจะรู้สึกวุ่นหวุ่นชักคล้ายกับอาการจากยาบ้า ผู้เสพจะรู้สึกพอกใจและมีความสุข อาการที่ตามมา คือ มีความรู้สึกสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในที่นั่น เมื่อตอนนั้น "ถักสายป่าน" ไปทางด้านจิตใจซึ่งกันและกัน" อย่างที่คาดผันไว้ที่สำคัญผู้เสพมักมีความต้องการทางเพศสูงขึ้น แต่สามารถปฏิบัติได้ยาก

สิ่งน่าสังเกตคือ ผู้เสพบางคนอาจจะประสบกับผลข้างเคียงของยา คือ อาจมีการคลื่นไส้เล็กน้อย อาจมีอาเจียนก็ได้ กล้ามเนื้อความอ่อนแรงตัว ทำให้ปวดเกร็งตัว หายใจลำบาก และมีอาการร้อนวูบวาบไปตามลำตัว บางคนมีอาการปวดศีรษะ เกิดอาการตากระตุก (nystagmus) ก็ได้ อาการข้างเคียงที่ไม่


พึงประสงค์นี้อาจอยู่นานถึง 24 ชั่วโมง

การเสพยาอีและยาเสพติดแล้วข้าวอก จึงไม่ทำให้ผู้เสพได้รับผลที่พึงประสงค์ ตรงกันข้าม ผู้เสพกลับได้ผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการมากขึ้น ถ้าเสพข้าวอกก็จะเกิดอาการเสพยาอีเกินขนาดทำให้มีอาการ sympathetic hyperactivity คือ ความตื่นแลือดและชีพจรแข็งสูง ม่านตาจะขยาย หัวใจเต้นผิดปกติ เกิดอาการซัก บางคนมีไข้สูงจัด กล้ามเนื้อเน่าตายถล่มเป็นพิษมีอาการตับเป็นพิษ บางคนมีอาการใจสั่น กระสับกระส่าย อาจมีอาการคลื่นคลื่น หัวใจระวง ประสาทหลอน คือ มีอาการทางโรคจิตคล้ายผู้ป่วยโรคจิตเภท (schizophrenia) อาการเหล่านี้เกิดจาก dopamine มีขนาดมากเกินไปนั่นเอง

ในรายงานของ ๓ 'นักจิตแพทย์' พบว่า มีรายงานถึงการเสพยาอีและยาเสพทำให้เสียชีวิตได้ทั้งนี้ เพราะเกิดภาวะ sympathetic hyperactivity อย่างมากมายและฉับพลัน ทำให้ร่างกายไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้พันจากขึ้นอันตรายได้เพียงแต่ผลด้านนี้ไม่ถูกพูดถึงมากนัก

ในฐานะสารเสพติด ยาอี และยาเสพติด ก็ทำก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบประสาทไม่น้อย และในฐานะตัวกระตุ้นอารมณ์รัก ยาอีและยาเสพจะเป็นเพียงความฝันเพียงชั่วครั้งชั่วคราวที่พร้อมจะกลับมาทำร้ายได้ทุกเมื่อ

.....
ข้อมูลจาก <http://www.mahidol.ac.th/mahidol/rarpc/v4328.html>



การขาดข้อมูลทำให้หลายคนเชื่อว่ายาเลิฟและยาอีเป็นยาที่ช่วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศ แต่ความจริงคือ มีโอกาส
นำไปสู่โรคจิตเภท