

วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕

ประจำวัน
ฉบับที่ ๘๕๓๙

— ..สีน้ำเงิน .. —

อัมรรัตน์



กับน้ำที่เคลื่อนที่ในสำหรับเครื่องจักร
เพรากลันจิกโคลนน้ำราคาน้ำกับน้ำ
สารดังต่อไปนี้อ่านจากซ้ายจริงๆ
อยู่กับคนกลุ่มน้อย คือกลุ่มน้ำรายได้
สูงเท่านั้น แต่มาถึงบุญล้นจึงได้
เพิ่มผลผลิตขึ้นเรื่อยๆ บันเฉพย์ที่จัง
หวัดเชียงรายสามารถให้ผลผลิตล้นจึง
ถึง ๒๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม นอกจากนั้นยัง^{มี}
มลชนจากชั้นหัวดินฯ อีก เช่น จาก
เชียงใหม่ เช่นเดียวกัน

เนื่องจากปริมาณเดินเข้าเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาน้ำที่เคยสูงมากนั้นลดลง พอกผู้รายได้ระดับปานกลาง และผู้รายได้ต่ำบางส่วนสามารถซื้อผลไม้บานบีไก่ได้ แต่อย่างไรก็ตามสินค้าที่บังคับจัดเบี้ยผลไม้ที่มีราคาน้ำหนึ่งต่อตัน แม้ว่าราคาน้ำจะลดลงโดยเฉลี่ยจากกิโลกรัมละ ๑๐๐ กว่าบาท เป็นกิโลกรัมละ ๔๐—๖๐ บาทก็ตาม ความนิยมรับประทานเดินเข้าก้าวจะพร้าวหลายแบบนั้นในมีการซื้อขายในอนาคตอีกด้วย

ดังนี้ในห้องคลอดมี ด้วยกัน หลายพันธุ์ แต่เป็นที่รู้จักและนิยมปลูกกันนั้นมีดังนี้ ได้แก่ พันธุ์อย่างด้วย โควเชียร์ และกิมเจ็ง

พันธุ์สูตรด้วย เป็นพันธุ์ที่ปลูกมากในชั้นหัวดินเชียงราย ความต้องการเชิงเดียวได้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นภาระของอากาศหนาๆ ซึ่งสภาพอากาศหนาๆ เป็นพืชป่ามากที่สามารถออกดอกให้ผลลัพธ์และเปลี่ยนแปลงตัวเอง เมื่อแก่เดินที่จะมีสีแดงอมชมพูขาวๆ เนื่องจากลักษณะ ราชวนอน เปรี้ยวเดือนตุ่ยเมืองต่อ ลักษณะใบเดินเข้าพันธุ์นี้ ขาวๆ โควในกว้าง รูปใบบิดเป็นคลื่น ใบมี ๓—๕ คู่

พันธุ์โควเชียร์ ชอบอากาศที่มีความชื้นสูง และหนาๆ ด้วยสภาพอากาศไม่หนาวเย็นมากการเจริญเติบโตจะช้ากว่าพันธุ์อย่างด้วย แต่ในด้านของรสชาติแล้ว ดันเข้าพันธุ์โควเชียร์ เป็นพันธุ์ที่นิยมบีบีกมากที่สุด เพราะมีรสหวานสดมาก ผลไม้ เนื้อรานา ผิวของเปลือกออกสีแดงครื้น ลักษณะของผลเป็นรูปหัวใจอย่างเดียวได้ขาด

พันธุ์กิมเจ็ง เป็นพันธุ์ที่ชอบอากาศเป็นจัดเข่นกัน เทียบกับการให้ดอกออกผลแล้วก็เขียนน้ำด้วย ใช้เวลานาน และมักไม่มีออกผลอ้าสภาพอากาศไม่หนาวจัดร้อนๆ ตั้งแต่ บริมาณเดินเข้าพันธุ์กิมเจ็งเริ่มมีค่ายมีให้เห็นในห้องคลอดมากนัก แต่รสชาติค่อนข้าง ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม ผลสีแดงเข้ม

สภาพดินที่适合作栽培ที่สัมภันธ์

กับความต้องการของลูก

อากาศ สภาพอากาศที่ดีต้องการควร
เป็นอากาศร้อนชันในฤดูร้อน อากาศเย็น
ค่อนข้างแห้งในฤดูหนาว

ความชื้น มีความชื้นคัญมากต่อการปลูก
พันธุ์ เพราะฉันจะให้ผลดีเมื่อมีความชื้นใน
อากาศมากและความชื้นในดินก็ต้องเพียงพอ
คุ้ม โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังออกดอกให้ผล
ด้วยความชื้นไม่เพียงพอจะร้าว ด้านหากเป็น
เช่นที่มีความชื้นสัมภันธ์คงดีกว่า ๘๐% กลาง
คืน ๙๐% ในช่วงที่ลูกเข้าก้าวเดินเริ่มเจริญ^{ดี}
เดิบโดยของผลที่จะให้ผลที่มีคุณภาพดีที่สุด

ปริมาณฝน ปริมาณฝนตกลงในแหล่งปลูก
ดันเข้าก้าวอยู่ในระหว่าง ๗,๐๐๐—๙,๖๐๐ มิลลิเมตรต่อปี หากฝนน้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตรต่อปี น้ำที่ห้ามฟันน้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตรต่อปี การออกดอก(อากาศเริ่มหนาว) หากให้น้ำใน
ช่วงนี้จะแตกใบอ่อน หลังจากคัดการให้น้ำลง
ลูกเข้าก้าวเริ่มให้ดอก อาจจึงกระหងหักบานก็เป็น
ให้น้ำ การให้น้ำควรให้ก่อนน้ำอ้อม และเพิ่ม
ความชื้นด้วยผล เพื่อเร่งการเจริญเติบโตยิ่ง^{ดี}
ให้เกิดความแห้งแล้งเข้า ในการให้น้ำต้อง^{ดี}
ระวังการดึงดูดออกผลเป็นอันขาด เพราะ
จะทำให้ผลร่วงและขนาดของผลจะเล็กไปสู่
บุรุษหรือผลแตกหักที่เมื่อได้รับน้ำ หักที่หันไป
หลังจากน้ำเป็นเวลาสามเดือนต่อ กัน

อุณหภูมิ อุณหภูมิของอากาศช่วงก่อน^{ออกดอก}ควรอยู่ ระหว่าง ๐—๑๐ องศาเซลเซียส ระยะนานติดต่อกันประมาณ ๑๐ วัน อุณหภูมิต้องสูงกว่าผ่านเข้ามานานประมาณ ๑๐ วัน ช่วงที่หันมาหันนักก็เพียงพอสำหรับ ดันเข้าก้าวเริ่มแตกหัก

ดิน ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้อง^{ดี}
ควรเป็นดินร่วนเนินอย่าง หรือร่วนปนทรายก็^{ดี}
ได้แต่ควรมีความเป็นกรดเป็นค่างประมาณ ๖—๗
พันธุ์ปลูกลูกเข้าก้าวต้องมีการระบายน้ำได้ดี
น้ำไม่ขัง หน้าดินต้องลึก ดันเข้าก้าวต้องมีแรง
เพรากดีงบประมาณ ไม่สามารถด้านลมหายใจ ควร
ปลูกลูกเข้าก้าวไม่ค้างทำให้กึ่งหัก จึงควร
เลือกการปลูกต้องในเขตที่มีลมแรง แต่ด้านหาก
ไม่สามารถหันหน้าที่อันเหมาะสม สมใน เว่องนี้ได้
ควรปลูกไม่บังลมช่วยด้านทันทันพาย เช่น ไม้
ไผ่ กระถินธรรมชาติ ยุคเดิมตั้ง

การปลูกลันจ์

นอกจากลันจ์จะเป็นผลไม้ที่ชาวสวนหันมาปลูกเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้ว ต้นลันจ์เริ่มได้รับความนิยมในการนำมารปลูกไว้ภายนอกบ้านเรือนเดียว กัน มะม่วง หรือฟาร์กันบ้านด้วย หนอนอกจากสภาพพื้นาที่อากาศที่สัมพันธ์กับผลไม้ใน ยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับการปลูกลันจ์ที่นักปลูกต้นไม้มือสมัครเล่นควรจะรู้ไว้บ้าง ประการแรก เนื่องจากลันจ์ชอบอากาศร้อน การปลูกควรปลูกในฤดูฝน แต่ต้องอยู่ระหว่างวัยต่าให้เกิดน้ำขึ้นทั่วหมดทั่วไป ขนาดของหนอนต้องกว้างและสูงขึ้นอีก ๑ เมตร ใช้พ่างที่ผุดอีก ใบไม้แห้ง หรือหญ้าแห้งว่างที่กันหลุม จากนั้นจึงใช้ปุ๋ยคอก ๔ ปืน ขี้เจ้า ๒ ปืน ดินดี ๕๐ ปืน คอกเคลือบให้เข้ากันแล้วใส่ลงในหลุมโดยบีกไม้ไว้ตรงกลางหลุมเพื่อยืด ต้นลันจ์ ที่ปลูก ถ้าอยู่ในทุ่งพลาสติกให้อาดูงออก ก่อน ถ้าซ่าไว้ในกระเบื้องควรรดน้ำทุกวัน เช่นเดียวกับกันปลูกก่อนการปลูก ให้คายดิน ลงในโคนหลักแล้ววางต้นลันจ์ ลงยอดให้ตรงแล้วกดดินบริเวณโคนต้นให้แน่นพอควร ผูกเชือกรัดกับตัวต้นให้แนบกัน หลักจนแน่น เพื่อกันลมพัดไปคลอน หัวซัคคุมดิน เช่น พ่าง ใบหอย หญ้าแห้ง เที่ยวตากความชื้น และกันการซึบหน้าดินอีกที ถ้าเป็นฤดูแล้งต้องทำรากบังแดดด้วย จนกว่าลันจ์จะตั้งตัวให้ดี ถ้าออกลันจ์ที่ปลูกด้วยก็ต้องจะให้ผลเมื่อสามปี ๔ ปีขึ้นไป โดยลันจ์ออกดอกเดือนมกราคม เป็นช่อเล็กใหญ่ต่างกัน ถ้าซ่าอย่างยาวยิ่งให้ผลดก แต่ในระยะที่ต้นยังไม่แข็งแรงพอประมาณนี้ที่ต้องเด็ดผลหักเสียก่อน ท่อน เพื่อให้ผลดกในปีต่อไป และลันจ์จะให้ผลมากขึ้นเรื่อยๆ ตามช้านาฬิกองต้น

ศัตรุของลันจ์

ศัตรุลันจ์ ได้แก่ พากหนอนต่างๆ เช่น หนอนเจ้าปลาดัน หนอนช่อนเส้นกล่องใบ หนอนกินชาอ่อนๆ และหนอนเจ้าข้าว ผลลัพธ์เป็นต้น โดยเฉพาะหนอนปะการังหลังจะเริ่มจากตัวแก่ของแมลงวัน ไร้ใบฐานราบทอกหนอนจะโดยบุกร้ายในช่วงผล ทำให้ผลร่วงและเน่าเสีย ซึ่งจะสังเกตได้จากตัวที่ร้องลันจ์ ถ้ายกซอกขามาแล้วมีคราบขาว ผลที่ร่วงมักจะเป็นโรคถูกหนอนเจ้าข้าวเป็นส่วนใหญ่ ส่วนศัตรุอันดี ก็มี พากมวน(แมลงเกษตร) ไร่ ค้างคาว แต่อย่างไรก็ตามหากได้มีการบำรุงรักษาอย่างดี ก็ต้องและสมรรถภาพ คงจะเริ่มแรก มีการ

ให้ป่าย ตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้ลักษณะเป็นโรค ก็จะช่วยแก้ไขได้ค่อนเรื่อง โรคแมลง ได้อย่างมาก บัญหาเรื่องนี้ชาวสวนจึงไม่กลัวกันมากนัก แต่ศัตรุที่ชาวสวนไม่สามารถจะปราบได้ในปัจจุบันก็คือคนนี่เอง

