


លេខេទ្ទៃ ៣៣ ជនប៉ាង សំពាល់

វันអូក្រោះ ២ នីតុនាយក ភ.ស ២៤២៩

ទូរឈរ ទាមចាន់ហេងផលិម្ព

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



ทุเรียนเน็นหลังให้บันลอกหน้าหัวดี
กว่าอ่อนน้อมนิ่ว โภคภัณฑ์หลายเมืองไว้
ให้ลักษณะลักษณะเป็นหัวอก ติดใจในรส
ชาตินอนหัวเรือนจึงได้รับชมถูกว่าราษฎร์
น้ำผลไม้

ทุเรียนมีหลายชนิด ชื่อเรียกมาก
มาก เช่น ก้านยาว กบแม่ผ่า กบตัวเข้า กบ
เข็บหอยขาว กบเหมาราช กบซึ่งมี กบขันแห้ง
กบเจ้าคุณ ฉัตรทอง ฉัตรเงิน ฉัตรนาค หอย
ป้อยกัด หมอนทอง ก้าบินขาว ก้าบินแดง
ก้าบินสีน้ำเงิน ลวงเขียว ลวงทอง ชานี ย่านะ
หวาน กระดุมหอย สาวน้อย มังกร นาคราหอย
นาคราหอย อินัง ฯลฯ กดลักษณะทุเรียนใน
เมืองไทยมีอยู่เกิน ๒๐๐ สาย แต่ที่มีชื่อเด่น
นิยมเรียกกันในวงการค้าเพียง ๔๐-๕๐ ชื่อ^๑
เท่านั้น

จะยกเว้นต่างแต่ทุเรียนเริ่ม พลิดอก จน
แก่ดัดได้ส่องออกซึ่งคล้ายคนนี้จะอยู่ระหว่างเดือน
พฤษภาคม ถึงมิถุนายนของทุกปี เพราะจะรับ
เวลา ตั้งแต่เริ่มผลิตจนแก่ดัดได้ใช่หุเรียน
ประเกทพันธุ์ เน่า ได้แก่การดูแล ดูด
ชานี ย่านะหวาน ชุมพูดี ต้นทุเรียนเหล่านี้
จะเริ่มผลิตจากปีเดือนธันวาคม มกราคม
และคงจะบานหายอยู่กันไปจนบานหมด
ต้นใช้ระยะเวลา ๘-๙ วัน ดังนั้นทุเรียนจะ^๒
แก่ช้าหรือเร็วกว่ากันที่อยู่ในระยะ ๘-๙ วัน
และตั้งแต่ระยะผลิตจนทุเรียนจะแก่สุกเก็บ
ได้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม

ทุเรียนประเกทพันธุ์ ก朵 ได้แก่กับ
ต่างๆ ก้านยาว หมอนทอง ต้นทุเรียนเหล่านี้
จะเริ่มผลิตจากปีเดือนธันวาคม มกราคม
หลังทุเรียนพันธุ์ เน่าประมาณ ๑๐-๑๒ วัน
ตั้งแต่ต่างๆ ผลิตจนรุ่ง จนทุเรียนจะแก่สุก
เก็บได้ประมาณเดือนมิถุนายน

ทุเรียนประเกทพันธุ์ หนัก ได้แก่
กหงษ์ยันต์ อินัง ก้าบิน จะเริ่มผลิตจาก
พร้อมๆ กับทุเรียนประเกทพันธุ์ กลวงคือราก
ประมาณก朵 ทุเรียนประเกทพันธุ์ กลวงคือราก
ประมาณก朵 ทุเรียนประเกทพันธุ์ ก朵 ของระยะเดือนธันวาคม
กับทุเรียนประเกทพันธุ์ ก朵 ของระยะเดือนธันวาคม
ต้องบานจนถึงผลิตต่อไปประมาณ ๑๔๐-๑๕๐
วันหรือจะเก็บได้ประมาณเดือนกรกฎาคม

เวลาที่หุเรียนผลิตออกนั้น ยังเป็นช่วง
แบ่งออกเป็นสองเดือนพฤษภาคม และร่อง
เวลาคงต่อตอกบานจนถึงผลิตต่อไป จนถึงเดือนตุลาคมที่
หุเรียนผลิตออกเร็ว การเก็บจะดูกรองผล
หุเรียนก็จะเร็วขึ้น และตัวหุเรียนผลิตออกช้า
การเก็บจะดูกรองผลหุเรียนก็ย่อมช้าไปด้วย

ทุเรียนพันธุ์ กบ ทุเรียนพันธุ์ น้ำดอง
หวานบันกับหินเนื้อหิน มีลักษณะคล้าย
หัวหอยแห่มหอยด้วยตัว เปลือกเป็นวนตาม
เด็กแหลก ปล้ำแพลงตอนเล็กน้อย มีก้านยาว
ปานกลางปีรวมๆ ๖-๘ นิ้ว ขนาดค่อนข้าง

เล็ก เนื้อหุเรียนพันธุ์ กบ มีสีเหลืองหรือสีเหลือง

ทุเรียนพันธุ์ ชานี ลักษณะคล้าย
หัวหอยในญี่ปุ่นกับประเทศไทย กิโลกรัมต่อตัว
กิโลกรัมปีจะหัวหอยแต่กันบ้านดัน ราก
สันและใบใหญ่ สีเขียวปานน้ำตาลบนหนามีญี่ปุ่น
อยู่ห่างๆ ฐานโคนเดียวจะเป็นหนามเล็กตัว
สอง นอกจากโคนไกลั่วหนาม จะเรียกว่า
โคลงเข้าหัวหอยพูหนามดัน และตัว เมื่อสุก
ปีอ่อนมีสีเขียวแกมน้ำตาลปีกตือกหนึ่งชั้น ๒

๓ ๔ และอาจถึง ๖ พูโคนหาดไกลั่วโคนหัวหอย
พูเมล็ดกับกหงษ์ หุบหักน้ำกิน น้ำไม่มีพูดี ๗
หนึ่งปี ๗-๘ เม็ดต่อตัว ขนาดค่อนข้างของการเล็ก
และร่อง หัวเมล็ดแบบแทบแบบ ๘
หนังสีเหลืองจัดหัวจ้ำปานมีก้อนเล็กน้อยรวมมัน
มากกว่าหัว

ทุเรียนพันธุ์ ก朵 ลักษณะคล้ายหัวหอย
ญี่ปุ่นกับประเทศไทย กิโลกรัมกิโลกรัมรูปทรงค่อน
ข้างยาวหัวหอยเรียวกด ขัวค่อนข้างใหญ่หัว
ประยูรน้ำเมล็ดน้อย เวลาสักเปลือกมีสีเขียว
อ่อน หนานในญี่ปุ่นหัวหอย เนื้อค่อนข้างหยาบ
ตัวจ้ำปานอ่อน กลืนค่อนข้างจุ่นราษฎร์หวานมาก
กว่ามัน เวลาสักก็จะระ

ประทศไทยจังหวัดที่ปลูกหุเรียนกันมาก
และเป็นผลไม้ชนิดอีสานของจังหวัดอุดรธานีซึ่ง
ทางบ้านได้วางเป็นผลไม้ประจำจังหวัด ได้แก่
จังหวัดหนองบัว

รองลงมาได้แก่จังหวัดจันทบุรี และราชบุรี
เพราระบีนบัวเรือนหมกมีประทศและคิน ที่
สามารถทำสำหรับการปลูกหุเรียนเป็นผลไม้
ซึ่งมีราคานะหัวหอยหุเรียนสูงชาร์ดวน จึง
นิยมปลูกกันอย่างกว้างขวาง ถ้าบ้านเดินพื้น
อาภาก็ออกตัวหุเรียนออกผลลัพธ์ ผลผลิต
ต่อไร่ต่อไร่ในอัตราประมาณ ๑,๕๐๐-๑๕๐๐ กก.

ส่วนทางภาคใต้ของประเทศไทยมี ปลูก
หุเรียนกันหัวหอย และหุเรียนออกซึ่งชาติชาติ
กว่าภาคกลาง

บันทึกเรียนของครัวก่าวก้าวหนด เนื่องจากในระบบคณบัญชีมานมาราชวัสดุนพดไม่ต้องประสมกับภาวะอากาศเปลี่ยนไปตามเดือนทั้ง ๑๒ เดือนจะทำให้เกิดความเสียหายและขาดหายของสินค้าคงเหลือ เนื่องมาในระบบกล่องเดือนพฤษภาคมเริ่มมีฝนตกซึ่งมีความรุนแรงมาก ราษฎรบางส่วนเดือนตุลาคมเรียนขอขยายต่อเดือนธันวาคมไม่แก้จัด เพราะในช่วงเดือนธันวาคมจะมีอากาศหนาวเย็นมาก หากได้วันน้ำหล่อ

เชื่อมมากเกินไปที่เรียนที่ได้จะมีราก ช้าๆ ไม่ดี
เท่าที่ควรซึ่งจะทำให้ยากต่อราคาค่าตัว ดังนั้นผู้
บริโภคถ้าหากไม่มีหลักในการซื้อขายก็เรียน ห
จะต้องการจะใช้ ก็เรียนมิคุณภาพไม่ดี

๔๘๙ ๕๗ ๕๙ ๖๒ ๖๔ ๖๖ ๖๘
วิชเลือกชักหัวเรือน เลือกข้อที่เรียนที่
หักแล้วจะเหมือนแก่การนับไปคันที่ ทันนี้
ใช้ทั่วไป

๙. การคุมกลืน โดยปอกติดกับเรียนที่พอ
เหมาะสมกับการรับประทานคือ เนื่องน้ำและไม่
จะดีดมือ ผู้ช่วยนักเรียนห้องชั้นซ้ายการคุม
กลืนได้

๒. การติดทุ่นเรือน้ำที่สักและวัวเมืองติดหัวนำ
และไกรกหัน ตามดูภายนอกจะมีเสียงไฟรากมาก
พึ่งได้ชัดเจน เพราะฉะนี้ซ่องว่าจะระหว่างเป็นอึก
กับเนื่องมาก

๓. ก้านผลหรือป้อง เมื่อทุเรียนแก่จะมี,
ตักษณเขบวนโถ เวลาข้ามือดูบดุจชั้รีสก์ลาก ฯ
สำหรับคุณค่าทางอาหารของ ทุเรียน ใน
ส่วนที่กินได้ ๑๐๐ กรัม มีแคลอรี่ ๑๖๕ แคลอรี่
ไขมัน ๐.๖ กรัมคาร์บ ๒๘.๓ กรัม
โปรตีน ๒.๔ กรัม เฟตตี้ ๐.๔ กรัม แคลเซ-
เชียร์ ๒๐ มิลลิกรัมฟอสฟอรัส ๖๓ มิลลิกรัม
เหล็ก ๙ มิลลิกรัม ไวดามิน ๑๙ หน่วย
สากระ ไวดามินวีทีนี ๐.๖๗ มิลลิกรัม ไวดามิน
บี.๒ ๐.๒๙ มิลลิกรัม ในอาหาร ๑.๒ มิลลิกรัม
ไวดามินซี ๓.๘ มิลลิกรัม (จากการวิเคราะห์
ของกองโภชนาการกรมอนามัย)

ในด้านการส่งออกหุ้นเรียนเป็นผลไม้ชนิด
หนึ่งที่น่ารายได้เช่นประเทคบันหัน รวมใช้ชื่ออย
อีกชื่อชาวต่างบุรุษ叫做ช่วนไหง ที่เคยรักษา
หุ้นเรียน และไม่ชอบกลืนหุ้นเรียน แต่ยังมีชาว
ต่างประเทคถือมากโดยเฉพาะชาวເອເຊີຍ และ
ไม่ใช่ที่หลังໃຫດใน ราชอาณาจักร เรียนที่ไม่
เหมือนผลไม้อื่น

ในบี ๒๕๒๐ ประเทศไทยสั่งห้ามเรียน
ออกนอกบ้านนักเรียน ๓๑ จ้านบาก และได้เพิ่มเป็น
๓๒ จ้านบาก และ ๔๗ จ้านบากในบี ๒๕๒๑
และ ๒๕๒๒ คำนึงถ้วน ผลักดันให้ยกขึ้นอย่างไทย
ได้แก่ อ่องกง และสิงคโปร์ และการท่องเที่ยวกับ
ในบีท่อกรูป มีแนวโน้มลงชั้นเรื่อยๆ ความความ
ต้องการของตลาดท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น