


## หัวข้อแปลง

ปีที่๒๖ ฉบับที่๘๘๘๘ วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

# การปลูกหอยแมลง

กรองหอย จันทร์

ส่วนบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตร



ห้อมแดงเป็นพืช พักที่นี่ ยอม รับประทาน  
หงในรูปสต แสงแปรรูปหรือใช้ประกอบการ  
ปรุงอาหารห้อมแดงมีกลิ่นฉุนและมีคุณค่าทาง  
อาหารแก่ร่างกายของมนุษย เช่น มีโปรตีน  
คาร์บอไฮเดรต แคลเซียม ไธโอลอวิน  
เป็นต้น ปริมาณชาตุอาหารและแร่ธาตุน้ำ  
จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาเก็บเกี่ยว ห้อม แดงและ  
ระยะเวลาที่เก็บรักษาห้อมแดง

ห้อมแต่งเป็นพิชไม่ล้มถูก เนื่อง อ่อนประ  
เกทคานบี สามารถปลูกพิชได้ด้วยการใช้หัว  
ห้อมแห้งที่เก็บไว้ก่อนนานๆ คงเด้อ ๑-๖ เดือน  
ซึ่งปลูกแล้วหัว ห้อม แห้ง จะเก็บนาน ไม่เกิน  
เดือน จะออกแทงใบอ่อนฉ้าไม่ปลูกสองเดือน และ  
จะผื่อแห้งหมดทั้งหัวและรากประทานไม่ได้ หัว  
ห้อมก่อนหนังๆ ซึ่งปลูกจากอ หัวจะเติบโตและ  
ให้หัวประมาณ ๒-๓๐ หัว แล้วแต่สภาพดิน  
พื้นที่อากาศและภาระด้วยกษา

กรรมวิชาการเกษตร ขอแนะนำ  
พันธุ์ช้องหอมแตงทับพบ ใน ท้องตลาด  
ปัจจุบันมีอยู่ 2 พันธุ์ ดังนี้คือ

๑. ห้อมแดง หนึ่งเมือง ภาคเหนือ  
หรือที่คนภาคเหนือเรียกว่า ห้อมบัว เป็นห้อม  
แดงที่มีเปลือกสีเหลืองปนดั้ม ขนาดหัว  
ปานกลางและมีรากละเอียดป่นซับ ขนาดหัว  
กว่าหัวกวาง ๑ หัวสามารถแยกได้ ๒-๓  
กลีบกลิ่นที่ปลูกจนจัดรสหวานถ้าปลูกก็ใช้ห้อม  
ทั่วพื้นที่ประเทศไทย ๑๐๐-๒๕๐ กิโลกรัม ต่อ  
ไร่ ปลูกกระเช้า ๒๐ คูณ ๒๐ เชือกติดครา ขนาด  
หัวห้อม ๑/๒ คูณ ๑/๒ คูณ ๑/๒ ซม.<sup>๓</sup> ปลูก  
หัวให้ผลผลิตได้ ๕-๘ หัว ต่อหลุ่ม หรือ  
กอ อายุ ๙๐ วัน เก็บเกี่ยวผลผลิตผุดต่อวันประมาณ  
๓,๐๐๐ กิโลกรัม ต้นห้อมแดงพันธุ์นี้  
ไม่มีดอกและเมล็ด เมื่อเก็บรักษาไว้มีเปอร์  
เซ็นต์แห้ง ผื่อ เน่า เสียหายมากถึง ๖๐%  
ห้อมพันธุ์นี้นิยมรับประทานในแต่ละภาคเหนือ  
มากและราคาค่อนข้างสูงกว่าห้อมอีกพันธุ์หนึ่ง  
ได้เดินนำทางด่อง ปลูก ในตดุ ฝัน ปราการว่า  
ห้อมพันธุ์นี้แก่เร็วอายุ ๔๕ วันก็เก็บเกี่ยวได้  
และคงหัวไว้มาก หัวนี้เป็นเพราะสภาราพดินพื้น  
อากาศ คือมีช่วงแห้งแสบด้วยนานาเกินความ  
ต้องการของห้อมและอุณหภูมิค่อนข้างสูง จึง  
ทำให้การเจริญเติบโตไม่ดีผลผลิตต่ำขนาดและ  
คุณภาพของหัวห้อมต่ำมากผลผลิตลดประมาณ  
๑๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอ  
ใจและไม่คุ้มทุน เนื่องด้วยการจังปลูกเพียงบีบ  
๑ ครั้งจะพะตดุหนาเวลานานและปลูกพอกกับ  
ไว้วันประทานดีอย่างมาก

๒. ห้องแตงพันธุ์ บาร์ช้าง หรือ  
เวียกวาหอมแตงศรีสะเกย เป็นห้องแตงที่มี  
ลักษณะสี่เหลี่ยมขนาดของหัวแตงต่างจากพันธุ์  
แรกอย่างชัดเจน คือมีลักษณะหัวกลม ส่วน  
กว้างมากกว่าส่วนซุ้ม ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกัน  
แตง เป็นลักษณะเหล่านี้ยกเว้นขนาดหัวใหญ่  
กว่า สมำเสมอ กว่า ๑ หัวจะมี ๑—๒ กลีบ  
กลีนฉุนจัด รัศมี “ แคก กอ ” และถุงหัวช้ำ  
กว่าห้อมบัวเล็กน้อย ใช้พันธุ์ “ ปลูก ” ๖๐๐-๓๐๐  
กิโลกรัมต่อตัวไว้ แล้วแต่ขนาดของหัวหอม  
ปลูกจะประมาณ ๒๐ ซม. ๒๐ ซม. ยกแปลงสูงจาก  
พื้นที่ ๒๐ ซม. แล้วคุณหมลงแปลง  
ด้วยฟางข้าวแห้งป่องๆ หัว ๔-๕ หัว  
ผุดผิดคุณหมลง ๔-๕ หัว ขนาด  
๑ ศูนย์ ๑ ศูนย์ ๐ ซม. หรือใหญ่กว่าเล็กน้อย  
ขนาดหัวทางหนาดค่อนข้างสมำเสมอต่อกว่า หคอม  
บัว อายุแก่จัด ๑๐๐ วัน ขึ้นไปผุดผิดสอดต่ำ  
ไว้ประมาณ ๕,๐๐๐ กิโลกรัมการเก็บรักษาจะ  
มีเปอร์เซนต์แห้งประมาณ ๓๐—๔๐ % แต่  
แต่ความแก่ของหอมแตงที่เก็บเกี่ยวนั้น คือถ้า  
ปล่อยให้แก่จัดจะมีเปอร์เซนต์ลดลง น้อยกว่า  
หัวไม่แก่จัด ห้อมแตงบางช้างนมดอก และใช้  
เม็ดในตุ่นหาน้ำมากที่สุด ซึ่งต้องหมั่นตรวจ  
ดูและเดินทางให้หมัด เพื่อจะสามารถเดินทางท้า  
ให้ขนาดหัวเล็กลง การเดก กอหรือจ้านวน  
หัวน้อยลง เนื่องจากต้องซ่อนไว้และอาหารไป  
เลียงตากและเม็ด

## การปลูกห้อมແಡັງທຳໄດ້ 2 ແບຄືອ

๑. โอดกใช้เมล็ดห้อมแตงทันก่อจัด  
ให้สันหนาและเก็บรักษาให้พักตัวอ่อนกระยะ  
หนึ่ง มาทำการเพาะโดยหว่านหรือโรยเป็น<sup>น้ำ</sup>  
แล้ว และรออยู่ๆ ผลเจียงก้าห้อมที่จะออกจาก  
เมล็ด โดยลดน้ำเช้าเย็นทุกวันจนโอดได้ขนาด  
ลักษณะร่องชั้นดินเมตร จึงนำไปย้ายปลูกลง<sup>น้ำ</sup>  
แปลงที่เตรียมไว้ ก้าห้อมแตงอายุประมาณ  
๓๐—๔๐ วันจึงย้ายปลูกได้

๒. โดยใช้หัวห้องแตงที่นกอันดับ  
ลิ่นเด็บรักษาไว้อร่าวน้อย ๒ เดือน ไม่  
เกิน ๖ เดือน ซึ่งหัวห้องที่เก็บไว้นี้จะเริ่มมี  
บางหัวแห้งตื้นอ่อน ในอ่อน วิธีนี้เกษตรกรรมกัก<sup>๔</sup>  
นิยมปลูกและทำกันมานาน เมื่อเตรียมทุก<sup>๕</sup>  
อย่างดีแล้ว เกษตรควรเก็บสี่กลบหน้าตินให้  
เรียบร้อยทั่วทั้งแปลง และจึงทำการปลูกโดย<sup>๖</sup>  
กำหนดให้ระยะห่างห่างกัน ๒๐ คูณ ๒๐เซ็น<sup>๗</sup>  
ติเมตรควรรับปลูกเป็นแท่ง เพื่อสะดวกในการ<sup>๘</sup>  
ปฏิบัติและรักษาโดยน้ำส่วน โคนหรือที่มีราก<sup>๙</sup>  
อยู่ด้านล่าง ให้ยกไปติดบนปลายของหัวต้นด้วย

บันจินครีหัว และอย่างดีแรงนักจะทำให้สำเร็จ ต้นซอกชารากจะงอกช้า เมื่อปลูกทั่วทั่วทุก แปลงแล้วคุณด้วยกลับหรือฟางข้าวและรับรอน้ำให้ชุ่ม ๆ เพื่อหอนจะได้อกแห้งตันอ่อนได้เร็ว ปกติดันอ่อนจะงอกแห้งภายใน ๗-๑๐ วัน

หอนแดงปลูกได้ตลอดปีแต่ช่วงที่เหมาะสมที่สุด คือฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคม—มกราคม เพราะหอนชอบอากาศเย็นและแห้ง ความชุ่มชื้นในอากาศต้องแห้งและวันสั้น คือมีแสงแดดเพียง ๘—๙ ชั่วโมง ต่อวัน

#### การดูแลรักษา

หลังจากปลูกหอนแดงแล้ว หมั่นควรดูแลหอนอย่างดี ดีสม่ำเสมอหันหันไปทางทิศที่ไม่ได้เมื่อครบ ๗ วัน ถ้าไม่ออกริบทำการปลูกซ้อม เช่นทันที หอนแดงเป็นพืชผักที่ค่อนข้างอ่อนน้ำจิ้งต้องรดน้ำให้ร่มเสมอ เกษตรกรทางภาคตะวันออกเนียงหนึ่งครั้งต่อวันหลังปลูก และวันละ ๒ ครั้ง เช้าเย็น เมื่อหอนอายุได้ ๔๐—๖๐ วัน หันหันเพราะอากาศค่อนข้างแห้งมีลมพัดแรงต่อวัน ส่วนในภาคเหนือเกษตรกรจะให้น้ำประมาณ ๓-๕ วันต่อครั้ง นอกจากนี้เมื่ออายุได้ ๓๐—๓๕ วัน ต้องใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ส่วนที่เหลือ โดยหัวน้ำปุ๋ยให้หัวและรดน้ำหรือเอาหัวเข้าแปลงจนชุ่ม

#### การบ่อหอนกันกำจัด

ควรฉีดยาฆ่าแมลงผสมยาภัณฑ์ ที่ราคาไม่แพงนักทุกวัน เพื่อยืดหักห้ามหอนแดงที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะงอก งามเตบโตและให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ

#### การเก็บเกี่ยว

เมื่อหอนอายุ ๗๐ วัน ไปแล้ว ควรสังเกตดูโดยการบีบใบในตรงรอยต่อ กับหัวหอน ถ้าอ่อนนี้ไม่แข็งแน่น แสดงว่าแก่แล้ว นอกนี้สีของใบจะลดความเขียวลง ปลายใบเริ่มเป็นสีเหลือง และใบมักจะเป็นลักษณะขี้น ปกติในฤดูหนาวหอนแดงจะมีอายุตั้งแต่ ๗๐—๑๐๐ วัน และแต่พันธุ์ จึงแก่จัดเต็มที่ ส่วนในฤดูฝนหอนแดงจะดองหัว และแก่ได้เพียงอายุ ๕๕ วัน ก็เก็บเกี่ยวได้พร้อมกันทั้ง ๒ พันธุ์ แค่ผลผลิตของหอนแดงทั้ง ๒ ฤดูจะแตกต่างกันคือ ในฤดูหนาวจะให้ผลผลิตมากเป็น ๒-๓ เท่าของฤดูฝน จึงเป็นเหตุให้หอนแดงในฤดูฝนมีราคาสูงกว่า

หลังการเก็บเกี่ยวแล้วนำม้าฝึกสอนในที่ร่มให้ใบเหี่ยวนแห้ง จากนั้น ก็มัดเป็นจุก คัดขนาดคัดพันธุ์ และนำไปเผาในไฟในที่ร่มให้ได้ลมโกรก เพื่อรับนายความชื้นจากหัวและใบออกไป

#### การเก็บรักษาไว้ทำพันธุ์

หอนแดงที่แก่จัดเก็บไว้ทำพันธุ์ ควรแยกเอาไว้ต่างหาก และทำการฉีดพ่นยาแก้ไข้เบนเซฟที่เจือจางให้หัว ศักดิ์จนแห้งสนิท จึงนำไปเก็บรักษาไว้ทำพันธุ์ จะช่วยบ้องกันมิให้หอนแดงเน่าเสียหายง่าย และไม่ควรนำมารับประทาน

มีบัญหาเกี่ยวกับการเกษตร ขอให้เขียนจดหมายไปปรึกษาคุณวิชัย คุณกุล หัวหน้าสำนักพัฒนาระบบทดแทนในโอลี กรมวิชาการเกษตร บางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๕๗๙—๐๘๙๓ หรือ โทร. ๕๗๙—๐๙๙๐—๔ ต่อ ๒๒๒๒ และเปิดพิพิธภัณฑ์ ปชส. ๔ ถนนเยอรมัน ขนาดคลื่น ๑๐๘๖ กิโลเมตร เวลา ๑๐.๐๕—๑๐.๓๐ นาฬิกา ของทุกวันเสาร์ ท่านจะได้รับคำตอบในวันเวลาที่นัดหมาย