

สวนอุดมฯ แบงคอกนิคปลูก “มะยงเชิดคุณภาพ”



คุณอุดมแบงบ้าและลักษณะการปลูกมะยงเชิด

ไปเดือน สิงหาคม 48 ที่ผ่านมา สวนอุดมการเกษตร ได้จำหน่ายกิจพันธุ์มะยงเชิดให้แก่ลูกค้ามากหลายท่าน ทั้งทางภาคอีสาน เช่น จังหวัด ขอนแก่น ยโสธร อุดรธานี เลย เรายาคายค่า พระคุณทุกท่านที่ได้มาอุดหนุนสวนอุดมการเกษตร โดยแต่ละท่านที่มาก็ถ้วน แต่มาจากการติดตามอ่าน นิตยสารที่ทางสวนอุดมการเกษตร ได้ลงโฆษณาทั้งสิ้น ส่วน ภาคกลางซึ่งเราได้ไปแนะนำและไปสาธิตวิธีการปลูก มะยงเชิดจำนวน 2 ตันที่สวน คุณ ไฟโรมัน วารปี พะ ซึ่งอยู่ใน จังหวัดนครนายกนี้เอง

ดังนั้นเรารึงจะแนะนำวิธีการปลูกให้กับผู้ที่ซื้อพันธุ์ ไม่มะยงเชิดให้ได้ทราบกันอีกรึ้ง ซึ่งบางท่านยังปลูกตามขั้นตอนทางวิชาการจนทำให้คุ้ยสูงยากและหลายขั้นตอนมาก สวนอุดมการเกษตรจึงนำวิธีการปลูกมาแนะนำให้ทราบกัน อีกรึ้ง

วิธีการปลูกมะยงเชิด

โดยธรรมชาติมะยงเชิดไม่ชอบสภาพที่ชื้นและ หรือน้ำท่วมขัง ถ้าเป็นที่ต่ำควรยกร่อง เพื่อระบายน้ำสวนที่ มีกรดค่อนข้างเนินiyahหรือมีกรดมีหินมากจนเกินไปควรต้อง ปรับปรุงคืนก่อน เพื่อให้เกิดสภาพความเหมาะสมในการ ปลูก

- ควรจัดระยะการปลูกแต่ละต้นห่างกันอย่างน้อย 7×7 เมตร

- ขนาดหลุมลึก 50 เซนติเมตร กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร

- เตรียม แกленบดิน ปุ๋ยคอก อย่างละเอหะนึง บุ่งกี และ ปุ๋ยชีวภาพ 2-3 กำมือ

- นำสิ่งที่เตรียมทั้งหมด ผสมเข้ากันกับดินที่บุ่ดใน หลุม ไม่แนะนำให้ใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูก

- นำกิจพันธุ์ลงปลูก โดยแกะถุงพลาสติกออก ระวัง

อย่าให้เดินแต่ กlobulin เท่าอยเดินในถุงทำกิ่งมะยงชิด และ
อย่าลืมแกะพลาสติกที่พันรอยเท้าของคุณ

-ปักไม้ค้ำยันกันลมโดยต้นมะยงชิด (อย่าปักให้
ใกล้กับโคนต้น)

-ถ้าปลูกในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัด ให้หาหนูๆ
แห้งคลุมโคนต้น และจัดทำร่มเงาพรางแสงแดดให้ต้นไม้
ด้วย

-ไม่แนะนำให้ปลูกต้นไม้อื่นใดเพื่อเป็นร่มเงาให้
มะยงชิด หรือไม่ปลูกใกล้ต้นมะยงชิด

-รดน้ำให้เปียกโซกหลังจากการปลูกเสร็จ และรด
น้ำทุก 3 วัน / ครั้ง

การดูแลรักษามะยงชิด

-การให้น้ำ ภายใน 2-3 วันรดน้ำ / ครั้ง (ในช่วง
ปลูก 2 ปีแรก)

-การใส่ปุ๋ย ต้องเข้าใจว่าอัตราการใช้ปุ๋ยของพืชจาก
คืนนั้น มากกว่าคืนสร้างปุ๋ยขึ้นมาใหม่ จึงต้องเพิ่มปุ๋ยลงใน
คืน เพื่อให้มีปุ๋ยใช้อย่างเพียงพอ

-การใส่ปุ๋ยทุก ๆ 6 เดือน(นับจากวันที่ปลูก) และ
นำให้ใช้ปุ๋ยกอกหรือปุ๋ยวิภาพเป็นหลัก ส่วนปุ๋ยทางใบ
จะนิด เมื่อมะยงชิดออกใบอ่อน ฉีดทุก 7 วัน จนกว่าใบ
อ่อนจะเหลือง (ใบเริ่มเขียวแก่) จึงหยุดฉีด โดยอาจผสมยา
ฆ่าแมลงพร้อมกับอาหารเสริมชีวภาพ และสารจับใบที่เดียว
เลยก็ได้ โดยการเติมน้ำให้ครึ่งค่อนถังyahซะก่อนแล้วค่อย
ผสมยาทีละชนิด

-การใส่ปุ๋ยทางคืน การใส่ต่องแวดรัศมีทรงพุ่มเข้า
หากำต้น (อย่าใส่ต่องโคนต้น)

-เพื่อป้องกันการสูญเสีย และเพื่อให้ต้นไม้ได้รับ
ประโยชน์จากปุ๋ยได้เต็มที่ ควรยกร่องขนาดเล็ก ๆ ตรงแนว
รัศมีทรงพุ่ม เป็นวงกลมล้อมรอบต้นมะยงชิด ปุ๋ยจะไม่หล
หนีไปกับน้ำเมื่อฝนตกอย่างแรง

-ส่วนวัชพืชนั้น นอกจากจะแซงอาหาร ยังกีดขวาง
การทำงานของพืชแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของโรคพืชและ
แมลงอีกด้วย

วิธีกำจัดวัชพืช

1. ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมี ปราบศัตรูพืชบริเวณใต้
ทรงพุ่ม

2. ห้ามตากหรือพรวนดินบริเวณใต้ทรงพุ่ม เพราะ
จะทำให้ไปกระทบรวมมะยงชิดทำให้มะยงชิดจะงอกการ
เจริญเติบโต

3. ควรใช้วัชพืชอนทิงในขณะที่วัชพืชยังเล็กอยู่ หรือ
ใช้วัชพืชเมื่อวัชพืชโตแล้ว

โรคพืช

-โรคพืชส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อราก
 เช่น แอนแทรกโนส เป็นต้น มักพบในช่วงฝน หรือสภาพ
 อากาศชื้น

-ลักษณะอาการ เริ่มมีจุดเล็ก ๆ สีน้ำตาลอ่อนและ
ขยายวงกว้างขึ้นเป็นสีน้ำตาลเข้มที่ใบอ่อนยอดอ่อนกิ่งอ่อน
 ห่อดอก และผล

-สามารถป้องกันได้ด้วยสารเคมี เช่น เบนโนมิด
 แมนโคลเซป แคพแพน ไฮอะเบนคาดแซล คوبเปอร์ ออกซิ
 คลอไรด์ เป็นต้น

โรคแมลง

1. แมลงคื่อมทอง ด้วงงวง ฯลฯ จะกัดกินใบช่วง
 แตกใบอ่อนเท่านั้น ป้องกันด้วยสารเคมี เช่น สารบาริล เช่น
 เชฟวิน 85 , เมทาไมโลฟอส เช่น ทามารอน, โนโนโกร็อก
 ฟอส เช่น อะโซคริน

2. ด้วงเจาะลำต้น จะทำลายกัดกินชั้นท่อน้ำ ท่อ
 อหารา ต้นมะยงชิดจะตายอย่างรวดเร็วถ้าด้วงเจาะทำลาย
 ร่องลำต้น ป้องกันได้ด้วย การเผาทำลายกิ่ง หรือต้นที่ถูกด้วง
 เจาะ หรือใช้สารเคมี เมราไมโลฟอส เช่น ทามารอน, โนโน
 โกร็อกฟอส เช่น อะโซคริน เป็นต้น

