

เทคนิคการดูแลมะยงชิด สวนอุดมการเกษตร

สภาพการมะยงชิดในปีนี้

ในช่วงนี้เราชาวสวนคงจะรู้ว่าฤดูฝนในปีนี้ได้ทิ้งช่วงเร็วมาก ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาฝนจะทิ้งช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน ก็พอจะทำให้มีความชื้นอยู่ในดินมากพอสมควร แต่ในปีนี้ได้ทิ้งตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนตุลาคม ทำให้พื้นที่หลายพื้นที่ที่ปลูกมะยงชิดไม่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของดอกมะยงชิด เราจึงต้องให้น้ำหรือรดน้ำทางดินพอให้มีความชื้นในดิน อย่าให้แฉะมากเกินไป

วิธีการดูแลมะยงชิดที่กำลังจะออกดอกและให้ติดผลดก

ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ก็เป็นช่วงที่มะยงชิดจะออกดอกและติดผลผลิต ดังนั้นเราชาวสวนก็ต้องดูแลรักษาในช่วงที่มะยงชิดกำลังออกดอกและติดผลด้วย ไม่ใช่ฆ่าปล่อยให้ไปตามธรรมชาติโดยไม่มีการดูแลเลย

โดยวิธีการดูแลมะยงชิดนั้นเป็นวิธีที่ไม่ยากอย่างที่บางคนเข้าใจเลย ถ้าเราทำความเข้าใจกับมันได้อย่างถ่องแท้ ดังนั้นสวนอุดมการเกษตรจึงมีวิธีการดูแลมะยงชิดที่กำลังออกดอกและให้ติดผลดกมานำเสนอชาวสวนที่สนใจจะปลูกมะยงชิด หรือปลูกแล้วก็ตาม

เริ่มโดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ควรฉีดฮอร์โมน



อาหารเสริมชีวภาพ ยาฆ่าแมลง สารจับใบ และตัวทำละลาย ก็คือน้ำ โดยคิดเป็นอัตราส่วน 3:1 นั่นเอง การฉีดครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเร่งการเปิดตาดอก และป้องกันต้นมะยงชิดขาดแร่ธาตุอาหารได้อีกด้วย ส่วนการรดน้ำนั้นเราชาวสวนต้องสังเกตลักษณะของหน้าดินหรือบริเวณที่ปลูกมะยงชิดว่าแห้งมากหรือเปล่า ถ้าแห้งมากก็ควรจะรดน้ำพอประมาณแต่อย่ารดมากเกินไป เพราะจะทำให้มะยงชิดแตกใบอ่อนได้ หรือที่เขาเรียกภาษาชาวสวนว่า “บ้าใบ” นั่นเอง ซึ่งจะมีผลทำให้มะยงชิดไม่ออกดอก หรืออาจจะออกน้อยก็ได้ ในช่วงปลาย





เดือนธันวาคมมะขงชิดก็จะเริ่มออกดอก และดอกก็จะค่อยๆ เริ่มบาน ในช่วงที่ดอกมะขงชิดกำลังบานอยู่นั้นเราชาวสวน ไม่ต้องไปฉีดฮอร์โมนใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเป็นช่วงที่ดอกมะขงชิด กำลังผสมเกสรอยู่ถ้าท่านนำฮอร์โมนไปฉีดในช่วงนี้จะทำให้ ดอกมะขงชิดชะงักทำให้มะขงชิดไม่ผสมเกสร และจะทำให้ ไม่ติดลูก ส่วนการให้น้ำนั้นก็ควรรดน้ำ 3 วันต่อ 1 ครั้ง โดย เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ ตามขนาดของผลมะขงชิด

หลังจากที่ดอกมะขงชิดผสมเกสรแล้ว เราก็คอย สังเกตดูว่าดอกมะขงชิดเริ่มที่จะเป็นสีน้ำตาลไหม้ เราชาว สวนไม่ต้องตกใจ เป็นเพราะดอกมะขงชิดเริ่มที่จะโรย และ ติดลูกเล็กๆ แล้ว เมื่อมะขงชิดผลเท่าเมล็ดถั่วเขียวเราควรฉีด ฮอร์โมน คืออาหารเสริมชีวภาพ ยาฆ่าแมลง สารจับใบ ตาม อัตราส่วนการผสมยาดังนี้ 2:1:1 ยกตัวอย่างเช่น

- อาหารเสริมชีวภาพ 10 ซีซี
- ยาฆ่าแมลง 5 ซีซี
- สารจับใบ 5 ซีซี

ก่อนน้ำ 20 ลิตร โดยการผสมยา นั้นเราต้องใส่น้ำไป ก่อนประมาณก่อนถึง และใส่ยาฆ่าแมลงด้วยสารชีวภาพ และสารจับใบตามลำดับ คนให้เข้ากันแล้วฉีดให้ทั่ว และควร รดน้ำในปริมาณที่พอเหมาะหรือให้มีความชื้นพอสมควร และกับปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามขนาดของผลมะขงชิด เมื่อ ผลมะขงชิดมีขนาดเท่าลูกมะนาวก็ควรฉีดฮอร์โมนอีกครั้ง หนึ่ง การฉีดครั้งนี้เพื่อขยายขนาดของผล ให้อาหารเสริม และ ป้องกันแมลงด้วย ช่วงระยะเวลาให้น้ำนั้น 3 วัน/1 ครั้ง โดย ให้อย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกว่ามะขงชิดจะเริ่มสี



กระด้างแล้วจึงหยุดให้น้ำเพื่อที่มะขงชิดจะได้เก็บความหวาน รอเพียงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านั้น ในช่วงที่มะขงชิด กำลังจะสุกเราก็อาจจะใช้ถุงกระดาษห่อผลมะขงชิดก็ได้ เพื่อป้องกันแมลงวันทองหรือนกมาจิกกิน

หมายเหตุ ตั้งแต่มะขงชิดออกดอก จนถึงวันเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช้ระยะเวลาประมาณ 75 วัน หรือ ประมาณ 2 เดือนครึ่งเท่านั้นเอง สวนอุดมการ เกษตรมีกิ่งพันธุ์มะขงชิดจำหน่ายเพียงที่เดียวเท่านั้น โดยไม่มีตัวแทนจำหน่ายที่ไหน ท่านผู้อ่านสนใจ สามารถโทรสอบถามได้ที่ คุณอุดม เอื้อใจ โทร. 0-3738-4025, 0-1451-9393 ที่อยู่ 61/3 ม.2 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000